

Таблица 1

Изменение биометрических показателей однолетних саженцев смородины черной в зависимости от применения элементов технологии, 2004 г.

Фракция побегов	Варианты опыта	Высота роста- ния, см	Количество почек, шт.		Диаметр, мм		Масса, г			Кол-во корней, шт.	Объем корневой системы, мл
			всего	генеративных	основания растения	черенка	придаточных корней	черенка	надземной части		
Базальная	Контроль без мульчи	42,8	18,3	0	6,9	8,1	4,3	9,7	9,6	10,2	4,5
	Контроль + мульча	49,2	21,1	4,9	8,5	8,9	4,7	9,2	13,2	11,0	4,8
	Феникс без мульчи	49,8	21,7	2,9	7,4	6,9	4,6	8,5	11,1	11,3	4,3
	Феникс + мульча	49,9	24,5	4,5	8,6	8,9	5,0	10,1	13,1	11,9	5,1
НСР _{0,95}		4,0	3,1	2,3	0,7	0,7	1,7	0,7	1,0	1,7	0,7
Средняя	Контроль без мульчи	38,9	16,7	0	6,4	6,7	4,0	6,7	7,4	10,6	3,0
	Контроль + мульча	52,7	20,3	2,6	7,4	7,7	4,6	8,0	10,2	11,7	5,4
	Феникс без мульчи	46,1	22,7	3,2	8,1	8,0	6,2	8,5	9,7	13,3	4,7
	Феникс + мульча	50,4	22,1	4,1	8,2	8,2	5,3	9,6	12,0	12,8	4,4
НСР _{0,95}		6,5	4,7	2,9	1,2	1,1	0,8	2,0	2,0	2,2	0,8
Апикальная	Контроль без мульчи	33,6	14,0	0	5,9	6,2	2,8	4,8	6,0	8,5	2,6
	Контроль + мульча	39,7	17,6	1,5	6,3	6,8	3,1	5,3	7,5	9,6	3,0
	Феникс без мульчи	44,0	16,7	0,8	6,8	6,7	4,4	5,4	8,2	9,1	3,8
	Феникс + мульча	49,6	20,7	2,8	7,0	7,0	4,2	6,2	10,1	11,7	3,9
НСР _{0,95}		6,2	1,1	1,1	0,6	0,7	0,9	1,0	1,1	1,6	0,6
Среднее	Контроль без мульчи	38,4	16,3	0	6,4	7,0	3,7	7,1	7,7	10,0	3,4
	Контроль + мульча	44,8	20,4	2,3	7,4	7,2	5,1	7,5	9,7	11,2	4,3
	Феникс без мульчи	47,4	19,7	3,0	7,4	7,8	4,1	7,5	10,3	10,8	4,4
	Феникс + мульча	50,0	22,4	3,8	7,9	8,0	4,8	8,6	8,6	12,5	4,5